Augenärztliche Notfälle in der Hausarztpraxis

Leitsymptome

Schmerzen

Fremdkörper
- Anamnese
- ➢ Novesin 0,4 %
- ➢ Zuerst subtarsal suchen (ekroponieren), ev. mit **Fluorescein** anfärben
- ➢ Fremdkörper mit Wattestäbchen entfernen
- ➢ Bei Rosthof –> Entfernung am Folgetag (Augenarzt)
- ➢ Floxal AS-Verband

Hornhaut-Erosio
- Anamnese (z. B. Fingernagel, Astverletzung)
- ➢ **Fluorescein** anfärben
- ➢ Floxal AS-Verband
- ➢ Paracetamol in Reserve
- ➢ Augenarztkontrolle bei Persistenz

Schweisserblende (Photokeratitis)
- Schweissarbeit
- Höhensonne
- Solarium
- ➢ **Fluorescein** anfärben
- ➢ Floxal AS-Verband
- ➢ Paracetamol in Reserve
- ➢ Augenarztkontrolle bei Persistenz

Glaukomanfall
- Schmerzhaftes, gerötetes Auge
- Übelkeit/Erbrechen
- Farbringe um Lichtquellen
- Mittelweite, lichtträge Pupille
- Palpatorisch hartes Auge
- ➢ Diamox 500 mg i.v. (oder per os)
- ➢ Sofortige Zuweisung Augenklinik

Iridozyklitis
- Augenschmerz (dumpf, bohrend)
- Gerötete Augen (meist beids.)
- Starker Tränenfluss
- Photophobie
- Sehstörung
- ➢ Sofort zum Augenarzt

Sekret/Rötung

Konjunktivitis
- Bindehautinjektion
- Einseitig od. beidseitig (bakt. vs. viral)
- Wässriges Sekret (selten eitrig)
- Verkrustete Wimpern
- Lymphknoten präaurikulär, submandibulär
- ➢ Kontaktlinsen entfernen
- ➢ Befeuchtende AT
- ➢ Spersapolymyxin AT 3–5x/d*
- ➢ Floxal bei Säuglingen/Kleinkindern*
- ➢ Konsultation Augenarzt, falls nicht innert 3–5 Tagen besser

Keratitis
- Infiltration
- Kontaktlinsen-assoziiert
- **Fluorescein anfärben**
- Keratitis dendritica (**Fluorescein-pos**.)
- Sofort zum Augenarzt

Zoster ophthalmicus
- Hutchinson-Zeichen?**
- Verd. auf intraokulären Befall?
- Keratitis dendritica (**Fluorescein-pos.**)
- ➢ Sofort mit antiviraler Therapie beginnen
- ➢ Zum Augenarzt innert 24 h

Sehstörung

Plötzlicher Sehverlust
- ➢ SWIFT
- ➢ Zuweisung Augenklinik

Trübungen/Blitze
- Plötzlicher Russregen oder Mücken („mouche volantes“)
- Blitze, v a. nachts (Photopsien)
- ➢ Zuweisung Augenarzt oder Augenklinik innert 24 h

Akute Doppelbilder
- ➢ Neurostatus –> ggfls. Schädel-Bildgebung
- ➢ Anschliessend entweder Augenarzt oder Neurologe

Abkürzungen:
AT: Augentropfen
AS: Augensalbe
SWIFT: Swinging Flashlight Test

Hinweise:
* Nur bei Verdacht auf bakteriellen Superinfekt
** Hutchinson-Zeichen: Herpetiforme Hautläsion an der Nasenspitze (Warnsignal für mögliche Mitbeteiligung des Auges –> Zoster ophthalmicus)

Trauma

Verätzung?
- ➢ Ananmese: Lauge oder Säure?
- ➢ Novesin 0,4 %
- ➢ Sofort 15 min spülen mit RL oder NaCL 0,9 %
- ➢ Sofortige Zuweisung Augenklinik

Contusio
- ➢ Schweregrad abschätzen
- ➢ Zum Augenarzt innert 24 h

© mediX, 2024