



# Informationen und Checkliste für Zuweiser

## Monoklonale Antikörpertherapie mit mAB (RegenCov) bei Covid-19-Infektionen

Die Gabe erfolgt in der Tagesklinik im Spital Zollikerberg nach entsprechender Zuweisung, sofern folgende Kriterien erfüllt sind:

### 1. Indikation für die Gabe monoklonaler Antikörper

Es müssen alle allgemeinen Kriterien (A) erfüllt UND ein Risikofaktor (B) vorhanden sein, um für einen mAB zu qualifizieren:

#### A) Allgemeine Kriterien

1. Erwachsene und Jugendliche >12 Jahre alt mit einem Gewicht von  $\geq 40\text{kg}$  **UND**
2. einen Nachweis von SARS CoV-2 (falls immer möglich mit PCR; alternativ: Antigentest) **UND**
3. milder COVID-19 (keine Sauerstofftherapie) **UND**
4.  $\leq 5$  Tage nach dem Auftritt erster Symptome (Ausnahme: dieses Kriterium gilt nicht bei Personen mit Immunschwäche, siehe Risikokriterium 5. In diesem Fall müssen Patienten aber seronegativ sein).

#### B) Plus das Vorliegen eines der folgenden Risikokriterien:

- Patienten mit **hohem Risiko** für die Progression zu einer schweren Form (Hochrisikogruppe gemäss BAG-Kriterienliste, Details siehe Link und Anhang):
  - Erwachsene mit Trisomie 21
  - Schwangere
  - Erwachsene mit folgenden Vorerkrankungen
    1. Bluthochdruck
    2. Herz-Kreislauf-Erkrankungen
    3. Diabetes
    4. Chronische Lungen- und Atemwegserkrankungen
    5. Erkrankungen/Therapien mit Immunsuppression
    6. Krebs
    7. Adipositas
    8. Lebererkrankung
    9. Nierenerkrankung



- Patienten mit **Risikokriterium 5** der BAG-Liste (schwere Immunsuppression) sind zu priorisieren.
- Patienten **über 80 Jahre**, deren Behandlung sich nicht auf die Palliativmedizin beschränkt oder die geimpft oder genesen sind, und die einen negativen Antikörper Test haben

#### Kriterien, die für die direkte Gabe von mAB qualifizieren

- Alter > 80 Jahre
  - Symptombdauer ≤ 5 Tage
  - Keine vollständige Impfung/Genesung von Covid Infektion innerhalb der letzten 6 Monate
- ODER**
- Risiko für einen schweren Verlauf (Kriterien gemäss BAG-Liste)
  - Symptombdauer ≤ 5 Tage
  - Keine vollständige Impfung/ Genesung von Covid Infektion innerhalb der letzten 6 Monate

## 2. Ausschlusskriterien

- Vollständig geimpfte Patienten (mit Boosterimpfung nach 6 Monaten) oder genesene Patienten mit COVID-19 in den letzten 6 Monaten (Ausnahmen siehe unten: Personen mit Risikokriterium 5 oder Patienten über 80 Jahre, die trotz Impfung oder durchgemachter Erkrankung seronegativ sind).

## 3. Serologie

- Der Hausarzt nimmt, sofern notwendig, die Serologie ab, siehe Kriterien unten

#### Kriterien, die zur weiteren Diagnostik eine SEROLOGIE erfordern

- Alter > 80 Jahre
  - Symptombdauer ≤ 5 Tage
  - Vollständige Impfung/Genesung von Covid Infektion innerhalb der letzten 6 Monate
- ODER**
- Immunsuppression (BAG-Liste Punkt 5; siehe Link auf der 1. Seite)
  - Symptombdauer ≤ 5 Tage
  - Vollständige Impfung/Genesung von Covid Infektion innerhalb der letzten 6 Monate
- ODER**
- Immunsuppression (BAG-Liste Punkt 5; siehe Link auf der 1. Seite)
  - **Symptome > 5 Tage**
  - Unabhängig ob geimpft oder genesen



#### 4. Zuweisung AMBULANTER Patienten

- Bei bestehender Indikation klärt der Zuweiser den Patienten mündlich über die Therapiemöglichkeit auf und dass es sich dabei aber nicht um eine etablierte Therapie handelt.
- Der Patient muss einverstanden sein. Es braucht keine schriftliche Einverständniserklärung.
- Die Zuweisung erfolgt mit dem **Anmeldeformular** an [mAK\\_Zolli@spitalzollikerberg.ch](mailto:mAK_Zolli@spitalzollikerberg.ch) und **zwingend zusätzlich telefonisch** unter **T 044 396 71 18** (jeweils von Montag- Freitag, 08.00 – 17.00 Uhr):
- Notwendige Informationen für Anmeldung (siehe auch Anmeldeformular):
  - Personalien, Adresse, KK, Telefon und E-Mail des Patienten
  - Zeitpunkt Symptombeginn, Diagnostik (Antigen/PCR, Datum/Zeit)
  - Covid-Impfstatus, frühere Covid-Erkrankung erfragen
  - Komorbiditäten, Risikofaktoren gemäss BAG Liste, Immunsuppression
- Der Zuweiser bespricht bei ambulanten Patienten die Indikation mit der zuständigen Infektiologin oder einem Kaderarzt Medizin des Spitals Zollikerberg.
- Die zeitnahe Durchführung der Infusionstherapie wird vom Spital Zollikerberg organisiert.
- Die Verabreichung der mAB für ambulante Patienten erfolgt in der Tagesklinik des Spitals Zollikerberg.
  - Vor der Infusionstherapie wird nochmals ein nasopharyngealer Abstrich für eine SARS-Cov2 PCR in unserer Tagesklinik abgenommen. Dies ermöglicht, einen Virusmutation nachzuweisen, falls im späteren Verlauf notwendig.

#### Anhang

1. Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie (SSI) und Clinical Care Group (CCG) der Swiss National COVID-19 Science Task Force zum Einsatz monoklonaler Antikörpertherapien mit Casirivimab/Imdevimab und Sotrovimab 12. November 2021
2. Zuweiserformular: ANMELDUNG ZUR AMBULANTEN BEHANDLUNG MIT MONOKLONALEN ANTIKÖRPERN (REGEN-COV™) BEI COVID-19 INFEKTION