



## COVID-19-IMPfung

**Checkliste Impfstoff mit mRNA-Impfstoffen****✓ spezifisch vor 1. Impfung**

<b>Administrative Klärung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abklären, wie die zu impfende Person krankenversichert ist (OKP/Versichertenkarte)</li> <li>Die Identität der zu impfenden Person verifizieren</li> </ul>
<b>Abklärung Impfindikation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impfung für alle Personen ab 12 Jahren indiziert, <b>inklusive schwangere Frauen ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel</b></li> <li>Basierend auf der aktuellen Impfeempfehlung der EKIF/BAG <a href="http://www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen">www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen</a></li> </ul>
<b>Abklärung Kontraindikationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekannte Überempfindlichkeit auf Inhaltsstoffe des Impfstoffes (insbesondere Polyethylenglykol [PEG] resp. Makrogol)</li> </ul>
<b>Impfung aktuell nicht empfohlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kinder unter 12 Jahren</li> </ul>
<b>Abklärung eines Vorbehalts und besonderer Vorsichtsmassnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Generell bekannte Überempfindlichkeitsreaktionen/Allergien?</li> <li>Immunsuppression (angeboren, erworben, immunsuppressive Therapie einschliesslich Krebserkrankung unter Behandlung) → Impfindikation grosszügig nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch Facharzt resp. Fachärztin und nach entsprechender Aufklärung</li> <li><b>Für Schwangere im 1. Trimester: Eine Impfung ist grundsätzlich möglich und kann auf Wunsch der Frau durchgeführt werden.</b></li> </ol>

**✓ spezifisch vor 2. Impfung**

<b>Unerwünschte Impferscheinungen (UIE) nach erster Impfung?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentation im IT-Tool erfassen</li> <li>Unerwartete oder schwerwiegende UIE müssen von der medizinischen Fachperson, welche die UIE feststellt, an Swissmedic gemeldet werden</li> <li>Bei einer anaphylaktischen Reaktion nach der 1. Impfdosis sollte keine 2. Impfdosis gegeben werden. Siehe auch die Erläuterung in der Impfeempfehlung: <a href="http://www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen">www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen</a></li> <li>Das Auftreten eines "Covid-Arms" nach der ersten Impfung ist keine Kontraindikation für die Gabe der 2. Impfdosis</li> </ul>
<b>Meldung UIE Swissmedic</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Über Link zum Meldesystem «ELViS» im IT-Tool <a href="http://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmacovigilance/elvis.html">www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmacovigilance/elvis.html</a></li> </ul>



## ✓ Durchführung 1. Impfung/2. Impfung

<b>Aktueller Gesundheitszustand/ Covid-19 Anamnese</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generellen Gesundheitszustand abklären und entscheiden: Kann die Impfung heute erfolgen?</li> <li>• Akute fieberhafte Erkrankung? Impfung verschieben, bis die Symptome abgeklungen sind</li> <li>• Status nach bestätigter SARS-CoV-2 Infektion (PCR-/Antigentest/Anti-Spike oder Anti-Nukleokapsid IgG) (Selbsttests gelten nicht als Nachweis für eine durchgemachte Infektion; <a href="#">Aussagen und Konsequenzen verschiedener SARS-CoV-2-Tests</a> und auf <a href="http://www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen-Covid-19-Testung">www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen - Covid-19 Testung</a>): Impfung mit nur einer Impfdosis empfohlen falls mindestens 4 Wochen nach Infektion. Impfung schon nach Abklingen der Symptome möglich (mit 2 Dosen falls weniger als 4 Wochen nach Infektion). Ausnahme: bestätigte SARS-CoV-2 Infektion bei immundefizienten Personen: 2 Impfdosen innerhalb 3 Monaten</li> <li>• Bei SARS-CoV-2 Infektion nach der 1. Impfung: Vorgehen wie bei ungeimpften Personen nach bestätigter SARS-CoV-2 Infektion.</li> </ul>
<b>Aufklärung Klientin/Klient</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hat die zu impfende Person Fragen?</li> <li>• Hat sie das Informationsmaterial gelesen?</li> <li>• Auf mögliche UIE hinweisen, insbesondere auf mögliche allergische Reaktionen und Zeichen von Myokarditis und Perikarditis, wie Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit oder Herzklopfen</li> </ul>
<b>Einwilligung Klientin/Klient</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mündliche Einwilligung der zu impfenden Person zur Impfung auf Basis einer informierten Entscheidung sowie zur elektronischen Erfassung der Impfung im Datenerfassungssystem einholen</li> <li>• Schriftlichen Vermerk zur Einwilligung zur Impfung im Impfdatenblatt/IT-Tool machen</li> <li>• Urteilsfähigkeit: Bei Jugendlichen ab 12 Jahren die ohne gesetzliche Vertreter vorstellig werden, muss die Urteilsfähigkeit individuell beurteilt werden. Im Falle von Urteilsunfähigkeit muss die Einwilligung der gesetzlichen Vertretung vorliegen</li> </ul>
<b>Ausfüllen Impfdatenblatt/ Erfassung im IT-Tool</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eintragen der relevanten Daten der zu impfenden Person im IT-Tool</li> </ul>
<b>Aufbereitung Impfstoff</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe Merkblatt Hersteller: <a href="http://www.bbraun.ch/kit-covid19">www.bbraun.ch/kit-covid19</a> / <a href="http://www.comirnatyeducation.ch/">www.comirnatyeducation.ch/</a> / <a href="http://www.modernacovid19global.com">www.modernacovid19global.com</a></li> <li>• Mögliche Vorgehensweisen zur <u>Entnahme von 6 Dosen</u> Comirnaty®</li> <li>• Nicht schütteln, nur mehrmals umdrehen, nicht unnötig bewegen</li> <li>• Der Stopfen sollte mit der Aufziehnadel möglichst nur einmal durchstochen und die Bewegung der Kanüle minimiert werden.</li> </ul>
<b>Applikation Impfstoff</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe Merkblatt Hersteller: <a href="http://www.bbraun.ch/kit-covid19">www.bbraun.ch/kit-covid19</a> / <a href="http://www.comirnatyeducation.ch/">www.comirnatyeducation.ch/</a> / <a href="http://www.modernacovid19global.com">www.modernacovid19global.com</a></li> <li>• i. m. M. deltoideus</li> <li>• Beide Impfdosen mit gleichem Impfstoff, Abstand 28 Tage (Comirnaty®: mindestens 21 Tage)</li> <li>• Bei antikoagulierten Patienten und Patientinnen: Die Impfung erfolgt ebenfalls i. m., wichtig ist eine gute anschliessende Kompression (<a href="http://www.bag.admin.ch/impfplan">www.bag.admin.ch/impfplan</a>)</li> </ul>

## ✓ Nach 1. Impfung/2. Impfung

<b>Aufklärung Verhalten bei UIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darauf hinweisen, dass schwerwiegende oder unerwartete UIE gemeldet werden sollen und Klientin resp. Klient sich bei Ärztin/Arzt/Apothekerin/ Apotheker/Impfstelle melden soll</li> <li>• Ggfs. Kontaktnummer mitgeben</li> </ul>
<b>Aufklärung Verhalten generell nach 1./2. Impfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiterhin Verhaltens- und Hygieneregeln einhalten. Ausnahme sind private Treffen zwischen vollständig geimpften Personen (Verzicht auf Maske und Abstand möglich).</li> <li>• Falls nach 2. Impfung eine Boosterimpfung nötig wird, wird informiert.</li> <li>• Schwer immundefizienten Personen wird 4 Wochen nach der 2. Dosis eine Bestimmung der anti-Spike IgG zur Indikationsstellung einer allfälligen 3. Dosis empfohlen (siehe Kapitel 3.3 Impfpflicht).</li> <li>• Bei Auftreten von Covid-19-kompatiblen Symptomen Test durchführen (Impfung nicht 100% wirksam)</li> <li>• Bei vollständig geimpften Personen kann nach der letzten Dosis für einen Zeitraum von 12 Monaten auf eine Kontakt- und Reisequarantäne sowie gewisse andere grenzsanitarische Massnahmen verzichtet werden (gemäss kantonaler Weisung und Angaben BAG Webseite: <a href="#">Reisen (admin.ch)</a>).</li> <li>• Kein Minimalabstand zu anderen Impfungen notwendig</li> </ul>
<b>Abgabe Impfnachweis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impfnachweis aus IT-Tool mitgeben bzw. Eintrag im Impfausweis machen</li> <li>• Falls möglich Stempel und Unterschrift der impfenden Person</li> <li>• LOT-Nummer in Impfnachweis einkleben/eintragen</li> <li>• Information zum Impfzertifikat und auf Anfrage ausstellen: <a href="#">Covid-Zertifikat (admin.ch)</a></li> </ul>
<b>Aufbieten 2. Termin (falls nötig)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termin am gleichen Impfort mit gleichem Impfstoff, im IT-Tool vermerken</li> <li>• Ggfs. Terminkärtli mitgeben</li> <li>• Merkblatt mit Angaben zum Verhalten nach der Impfung mitgeben</li> </ul>
<b>Beobachtungszeit nach 1./2. Impfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für den Fall einer allergischen Reaktion muss geschultes Gesundheitspersonal und eine Notfalleinrichtung inklusive Adrenalin zur Verfügung stehen</li> <li>• Insbesondere Personen überwachen, die bereits direkt nach der Impfung Probleme hatten, z. B. Kreislaufprobleme</li> <li>• Alle geimpften Personen sollen mindestens 15 Minuten nach der Impfung am Impfort verweilen. Wenn die 1. Dosis gut toleriert wurde, ist eine Überwachung von 5 Minuten nach der 2. Dosis ausreichend.</li> </ul>