

Cholesterinsenkende Medikamente für Gesunde

1000 beschwerdefreie Personen - Altersdurchschnitt 57 Jahre - nehmen cholesterinsenkende Medikamente

| Herzinfarkt-10-Jahres-Risiko von | 10% | Statinbehandlung | keine Behandlung |
|---|------------|------------------|------------------|
| Herzinfarkt | | 75 | 100 |
| verhinderter Herzinfarkt | | 25 | |
| Medikament brachte keinen Nutzen | | 975 | |

| | 20% | Statinbehandlung | keine Behandlung |
|----------------------------------|------------|------------------|------------------|
| Herzinfarkt | | 150 | 200 |
| verhinderter Herzinfarkt | | 50 | |
| Medikament brachte keinen Nutzen | | 950 | |

| | 30% | Statinbehandlung | keine Behandlung |
|----------------------------------|------------|------------------|------------------|
| Herzinfarkt | | 225 | 300 |
| verhinderter Herzinfarkt | | 75 | |
| Medikament brachte keinen Nutzen | | 925 | |

Nutzen 25% der zu erwartenden Herzinfarkte werden verhindert

Schaden über 90% der PatientInnen nehmen das Medikament vergeblich

 mögliche Medikamenten-Nebenwirkungen, hohe Kosten

mediX empfiehlt eine Statinbehandlung bei einem 10-Jahres-Risiko für Herzinfarkt von 20% oder höher